

報識常學醫會社名又

保證實切有用信求務販出

格人及驗經識學有者持主

本報主筆

(乙)門診一元
貧病減半
路邊追加

以四時午至九上門
時診此四下時午

上海雲南路樂里第一弄

三九四三六話電
啟處號掛

之本幸門開代九有。的之藝售此。症一年之。醫然丹
微館隔。病爲藥效而確驗起各。本。且沉外殊市省方
百發之誼家推。者會鑒者。地是館愈。疴。出病醫一
也起諸道方精補。歷應。凡靈以有於賴。每人之。殊
斯。人便。館製試之如各藥有鑒霍見有愈奇我。
舉此輩之大願爲驗方有喻之代于然之效數料劑中氣

本丸用中國藥精製而成凡白濁新起淋瀝不爽
之大利到止疝之功絕無流弊

服法 每盒分四次服早晚空服時用開水吞下服盡二
服丸後禁忌烟酒及一切辛熱品又老白濁溺管
痛

價目 每盒大洋一元
每打大洋十元

主治 專治一切新久咳嗽神效無比

服法 每袋分三次服每日食後開水
調服或加冰糖少許尤佳

價目 每袋大洋三角
每打大洋三元

總售處上海幸福報館

杭州 李

製監波少張海上

本丸係用中藥精製而成凡白濁新起淋瀝不爽滑精刺痛者
之大有利到病止痛之功絕無流弊
服法 每盒分四次服早晚空腹時用開水吞下服盡二盒自見功效
總忌 服丸後禁煙酒及一切辛熱品又老白濁溺管不痛者服用
價目 每盒大洋一元
每打大洋十元

杭州 李惠民監製

本病之經過。大抵歷四週。或至六週而全愈。
本病亦有不幸而起併發症者。是雖由患者之生活不適宜。及療法之不適當。然亦往往偶
於體質者亦不少。

乙、急性淋與慢性淋

淋病之起。每從急性而移於慢性。故本病。為急性與慢性兩種。男子急性淋病。感染淋
菌後二日至五日內。尿道之部。即起微痒及灼熱之感。陰莖勃起尿意頻數。精液稍黃赤
而腫脹。下粘澀。再經二三天後。病勢漸趨於劇盛。一星期後。遂移行極于極期。此時
搔痒灼熱之感。變為疼痛。粘液變為膿汁。(污染于褲。留帶綠黃色之膿狀斑紋。此時
傳染力甚強。移易注意)漏出不已。尿道腔之內徑。甚為狹窄。放尿時滴瀝而出。不拋
其苦。夜間難於安睡。陰莖勃起益甚。疼痛益劇。頭痛食少。便秘寒熱。此等症狀。約
歷一星期後。漸移行于退步期。諸症逐漸輕減。如是約四星期。漸可向愈。此前尿道急
性淋之經過也。

紀儀署

第一七五期
(日五十月一年九十國民)

◀ **分三洋售份每** ▶

館址上海馬路雲南路口

定報價目
每份五分
每月一元二角
每季三元六角
每半年六元
每年十二元
外埠加郵費
廣告價目
第一版每行一元
第二版每行八角
第三版每行六角
第四版每行四角
第五版每行三角
第六版每行二角
第七版每行一角
第八版每行八分
第九版每行六分
第十版每行四分
第十一版每行三分
第十二版每行二分
第十三版每行一分
第十四版每行八分
第十五版每行六分
第十六版每行四分
第十七版每行三分
第十八版每行二分
第十九版每行一分
第二十版每行八分
第二十一版每行六分
第二十二版每行四分
第二十三版每行三分
第二十四版每行二分
第二十五版每行一分

更正

花柳病治療學

更正

本報第一百七十三期。
第六百九十六頁內。余
無言先生所題之下聯。
其原文爲「振興醫藥飛
雲飛渡」。被手民將飛
雲之雲字。誤排寧字。
特此更正。

又查福報新年祝詞內。
第一首第三句第五字。
錦字誤排鑄字。又第四
首第一句第七字。猜字
誤排矚字。特此更正。

我對於全國步行團組織
的一點小供獻
(無言)

息。就是「青年華僑組織全國步行團」。見有一種好消
謝。正令諸君起這樣偉大的思想。和那無畏的精神。我想
真。這五年當中。他們一定將南方的期限。是五年。和北方
極。玲瓏的地方。都要走到。雖然這件等事。是和平。我想
美。然而「英雄字典」中無難字。陸君等必獲步行容易方
曝。滿。不過我有一點小供獻。所謂「野人獻曝」。

(二)團內宜有醫生。旅行者或南或北。難免沒有雨
頭。而且各地氣候不同。最好須徵求一位中西兼
通。的青年同志。偕同出發。對於旅途保健。亦屬有
宜。這固然有助。對於旅途保健。亦屬有
益。這固然有助。對於旅途保健。亦屬有

(三)國內宜有國技家。現當國家多事之秋。國內
幾無一片乾淨土。而到處土匪蜂起。能有幾
長。國技的青年。借行。一路上定能免却多少危
險。內宜有攝影家。遊歷的時候。遇到甚麼古
蹟。風景。或有特殊的動植物。我們不能帶走的
攝。人一定要攝影下來才好。雖是攝影。不能帶走的
的。影。學。也要有美的研究。並不能嗎。而且這

續銀海新編

狀見睛珠氣色。乾澀如蠟。顛垂涎之光。其症有二。有陰虛陽虛。不能混治。調中益氣湯。一見內障黃症。陽虛兩目緊瞤者用。補腎丸。一補陰虛板柱枯朽。疎瀦障皮膏相調。反用五味并弱金。多加乾姜扶光的。

○坐起生花

坐起生花不必疑。君心仔細細尋思。外由渴視陽勞故。內爲荒淫酒色迷。元氣弱。精力竭。眼花頭昏速支持。若能保養真元水。勝似千金訪妙醫。

狀同好眼。別無他症。相人動作少過。或久坐久立。久眠久視。便覺頭眩目花暈運也。

(未完)

燕窩小談

命

(續)

帶。三)鄙人昔年游歷塞
然多出於南時有所聞寒
致者防也。以惟鮮有因
之策也。其預防方法多
於爐上置水一壺。攪其
用煮之。則用水之蒸汽
以抗伐之熱氣。急救出
方法。於悶倒時。急負出
門外。使風吹之。可刻
自愈。如過太遲。或已
氣絕者。仍以醫藥生
診治爲妥云。

(黃隨華)

退北之官。土人皮破帽。乘便採取。燕窩撲人。年老力弱。
或致墮崖而死。所取得者。名爲燕窩。其中潔白者爲上。
之官燕。羽毛交雜。黑色而有血痕者爲下。謂之毛燕。(說
濱石上有海粉。積結如苔。燕啄食之。吐出爲窩。紫紫殷殷
鳥人候其秋去。以修竿接窠取之。一說燕銜小魚。黏於
久而成窩。有烏白紅三色。紅者難得。紫色者尤佳。一說
燕銜海外。水邊難達。因銜小魚肉作窩。口銜之而飛。飛倦
投窩水中。浮之若杯。棧止其上。少息復銜之而飛。遇東南
則颼掠近岸。人就取之。一說南洋諸島有鳥。首尾如燕。而
小。毛如金絲。隨卵有子時。羣飛近沙泥有石處。啄蟻蝶
之蠶螺背上肉有兩筋。如楊柳絲堅潔而久。此燕食之肉消
筋不化。并津液咽出。結爲小窩。附於石上。久之與小雞鼓翼
海人依時拾拾吸出。結爲小窩。附於石上。久之與小雞鼓翼
筋不化。并津液咽出。結爲小窩。附於石上。久之與小雞鼓翼

途健婦指痛疾婦解
徑康女導苦病女決

法	種	各	有	內	本
不藥治病法	久帶靈效法	肝氣自療法	實驗退斑法	簡明辨症法	簡明辨症法
避孕簡便法	產後祛瘀法	通乳神效法	陰虛避免法	男界得胎法	男界得胎法
產後救急法	產門退腫法	立下脫衣法	乾血癆治法	經漏自療法	經漏自療法
陰瘻治癰法	胎前生治法	偏產急救法	背包生治法	橫生急救法	橫生急救法
	大洋	祇收	特價	洋裝	全書

多成膈症之故

澤瀉湯 澤瀉。白朮。
水飲入胃。由脾轉輸於三焦之油劑。飲邪停於三焦。故以白朮健脾。澤瀉利三焦之水。藥性二味。已足切合於病理矣。
厚朴大黃湯 厚朴。大黃。枳實。
金匱云。痰飲胸滿者。厚朴大黃湯主之。然此方與小承氣湯相同。胸滿疑是腹滿之誤。飲邪結於腸間。而腹滿。故可用此攻之。
甘遂。大戟。白芥子。
（謝光儀）

。誠爲對症。然肺爲
體輕
轉臟腑之上。其位至
必浮
主之力。直過其所。坐
入肺
功。富貴也。主非等
至爲

見（楊黃民）
 算也。故特炮用。使其經火。妙哉。仲師之製方也。

虎壁治癰癤
原名金龍滾绣球

此通房。小便數所以然者。
以上虛不能制下故也。此爲肺
中冷。必眩。多涎沫。甘草乾
薑湯以溫之。乾薑自註用陳
舊園謂肺體已虛。不任過辛之
味。炮之使辛味少減。是亦一法
余竊以爲非也。考金匱此湯
主治。乃有似乎肺寒癆熱之肺
病。實非肺寒正症。肺冷者。
當溫之。惟乾薑之用。多在足
太陰。使脾氣流通。而以乾薑

有奇効。奉國君注意。

本經第六十五篇方治法。生肌虎骨煎藥一方。有豕屎黃不得已而決不可棄。實然審試。蓋豕屎其性屬寒。補挾即已不易。何況

登春驅風之一門也。北人方較多於南方。婦女較多於男子。因北地時

冬令嚴寒。則家家戶戶更用煤火烘炕。炕上之人久受煤煙熏蒸。以致

熱入經絡。致成是症。虛火性寒。將其二條。(一不限活)以涼

尤佳。故要新神功。方用無色鹽一個。將其打碎。(一不限活)以涼

將鴨蛋一枚研末。和以水片。搗成丸。存內。將藥紙好入豆內

換一次火炙乾。日服三次。未破爛者。用銀針挑破。如法貼上。此方